

Brodifacoum 0,005%
Excipientes c.s.p. 100%

Cebo en bloque
listo para su uso

Rodenticida

e 10kg

INSTRUCCIONES DE USO

- Lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.
- Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación.
- Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar.
- El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control.
- El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de manipulación de alimentos, comederos, agujeros, madrigueras...).
- Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras.

- Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen rodenticidas y que no deben ser movidos o abiertos.
- Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el periodo de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios.
- Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos.
- Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo.
- No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
- Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación (el material del guante debe ser proporcionado por el titular de la autorización dentro de la información del producto).

- Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.
- La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas realizadas al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.
- Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación.
- Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anti-esteroide más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.

Instrucciones específicas:

- Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej.: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación.
- Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.
- Retirar el producto sobrante al final del tratamiento (no aplicable cuando se autorice explícitamente el uso en madrigueras).
- Para madrigueras: colocar el cebo de modo que se minimice la exposición de especies no objetivo y niños. Cubra o bloquee las entradas de las madrigueras cabadas para reducir los riesgos de rechazo y derrame del cebo.
- Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

DATOS SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS PROBABLES, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los

síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

En caso de:

- Exposición dérmica, lavar la piel con agua y agua jabonosa.
- Exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuague los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20).
- Contacto con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.
- Los portacebos deben etiquetarse con la siguiente información: "no mover o abrir";

"contiene un rodenticida"; "nombre del producto o número de autorización"; "sustancia(s) activa(s)"; "en caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20)".

- Peligroso para la fauna salvaje.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

- Al final del tratamiento elimínesse el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.
- El producto es estable durante 2 años.

INDICACIONES DE PELIGRO

- H360D Puede dañar al feto.

H373 Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
- P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280 Llavarse las manos después de la manipulación.
- P308+P313 En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

TIPO DE PRODUCTO 14.

ORGANISMOS DIANA

- Mus musculus (ratón común).
- Rattus norvegicus (rata parda o de alcantarilla).
- Rattus rattus (rata negra).

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN

- Interior: Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.
- Alrededor de edificaciones: Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Infestación alta: (60-100) g de cebo por punto de cebo.
- Infestación baja: (40-60) g de cebo por punto de cebo.

CATEGORÍA DE USUARIO

Personal profesional especializado.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

- Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si lo hay).
- La información del producto (ej: etiqueta y/o folleto) indicará claramente que el producto solo se suministrará a usuarios profesionales especializados que posean un certificado de capacitación. (ej: "solo para personal profesional especializado").
- No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa.
- Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento (a menos que se autorice el cebado permanente).
- No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si

- se alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente.
- No lavar los portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebo cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones.
- Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinversión.
- No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores.
- No usar el producto en tratamientos de cebado por pulpos.
- No aplicar el producto directamente en madrigueras.

OTRA INFORMACIÓN

- Debido a modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser efectivos tras el consumo del cebo.
- Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como

pinzas para su eliminación.

- Este producto contiene un agente amargante y un colorante.

Titular

D+S
oabe

DTS OABE S.L.

Pol. Industrial Zabala, parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)

Tel.: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82

www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

PELIGRO



Nº Registro D.G.S.P.:
ES/MI(NA)-2018-14-00271