

# LEUCO BF 25 Pasta Fresca

Brodifacoum \_\_\_\_\_ 0,0025%  
Excipientes c.s.p. \_\_\_\_\_ 100%

Cebo en pasta  
listo para su uso  
Tipo de producto 14  
Rodenticida

## INSTRUCCIONES DE USO

- Lea y siga la información del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.
- Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación.
- Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar.
- El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control.
- El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de antelación,

- cebaderos, agujeros, madrigueras...).
- Cuando sea posible, el portacebo debe estar fijado al suelo o a otras estructuras.
- Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen rodenticidas y que no deben ser movidos o abiertos.
- Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el período de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios.
- Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebo.
- Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo.
- No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.

- Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación (el material del guante debe ser proporcionado por el titular de la autorización dentro de la información del producto).
- Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.
- Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación cebo.
- Si después de un período de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.

## Instrucciones específicas:

- No abrir la bolsa que contiene el cebo.
- Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebo en zonas no sujetas a inundación.
- Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.
- Retirar el producto sobrante al final del tratamiento (no aplicable cuando se autorice explícitamente el uso en madrigueras).

**DATOS SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS PROBABLES, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En el caso severos, puede haber moratones y

presencia de sangre en heces u orina.

**Antídoto:** Vitamina K1 administrada únicamente por personal médico / veterinario.

**En caso de:**

- Exposición dérmica: lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Exposición ocular: compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y, si las tiene, enjuague los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.
- Exposición oral: enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20).
- Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.
- Los portacebos deben etiquetarse con la siguiente información: "no mover o abrir"; "contiene un rodenticida"; "nombre del producto o número de autorización";

# LEUCO BF Pasta Fresca

"sustancia(s) activa(s)"; "en caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20)".

• Peligroso para la fauna salvaje.

## INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

- Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja.
- El producto es estable durante 2 años.



## ATENCIÓN

**INDICACIONES DE PELIGRO**

- H373 Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**CONSEJOS DE PRUDENCIA**

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P308+P313 En caso de exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

**ORGANISMOS DIANA**

- Mus musculus (ratón común).
- Rattus norvegicus (rata parda o de alcantarilla).
- Rattus rattus (rata negra).

**ÁMBITO DE UTILIZACIÓN**

- Interior: Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.
- Alrededor de edificaciones y áreas abiertas y vertederos: Cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.

**DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

- Infestación alta: (60-100) g de cebo por punto de cebo.
- Infestación baja: (40-60) g de cebo por punto de cebo.

**CATEGORÍA DE USUARIO**

- Personal profesional especializado.
- Personal profesional.

**MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO**

- No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa.
- Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento (a menos que se autorice el cebado permanente).
- No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si se

alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente.

- No lavar el portacebo u otros utensilios utilizados en los puntos de cebo cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones.
- Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.
- Cuando los portacebos se coloquen cerca de sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.
- Cuando los portacebos se coloquen cerca de aguas superficiales (ej: ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.

**OTRA INFORMACIÓN**

- Debido al modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser efectivos tras el consumo del cebo.
- Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación.

Este producto contiene un agente amargante y un colorante.

**Titular**  
D+S  
oabe

**DTS OABE S.L.**  
Pol. Industrial Zabale, parc. 3  
48410 Orozko (Vizcaya)  
Telf.: 94 633 05 55  
Fax: 94 633 95 82  
[www.dts-oabe.com](http://www.dts-oabe.com)  
dts-oabe@dts-oabe.com

Nº Registro D.G.S.P.:  
ES/BB(NA)-2019-14-00592