

ETIQUETA INFORMATIVA HELITRÍN CIPER EC GREEN

Cipermetrina 40/6010,70%
Excipientes y disolventes100%

**Insecticida concentrado
microemulsionable en agua,
formulado para aplicar mediante
pulverización frente a un amplio
espectro de plagas.**

e1L

INDICACIONES DE USO:

Insecticida concentrado microemulsionable en agua, formulado para aplicar mediante pulverización frente a cucarachas, moscas, avispas, pulgas...

MODO DE EMPLEO:

- Exclusivamente por personal especializado.
- Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- No utilizar en presencia de personas.
- La aplicación del HELITRIN CIPER EC GREEN en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.
- Pulverización dirigida a zócalos y suelos con el producto diluido en agua. No podrá aplicarse de forma aérea, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones

tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

- No mezclar con otros productos químicos.
- Evitar el contacto con las superficies tratadas.
- No podrá aplicarse mediante equipos de termonebulización ni nebulización.
- No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.
- Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.
- Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.
- No aplicar en lugares visibles ni accesibles.

APLICACIÓN:

HELITRIN CIPER EC GREEN se microemulsiona en agua. Agitar hasta homogeneizar correctamente, la micro-emulsión obtenida se mantendrá estable al menos durante 48 horas.

RENDIMIENTO:

Aplicar un 1 litro de la microemulsión reconstituida por cada 10 m².

DOSIFICACIÓN:

- Tratamientos de mantenimiento: 50 ml en 10 litros de agua (0,5%).
- Tratamientos de choque: 500 ml en 10 litros de agua (5%).
- Tratamientos de infestación media: 300 ml en 10 litros de agua (3%).

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Pulverizador convencional.
- Pulverizador de acero inoxidable.

Fabricado y distribuido por:

DTS OABE, S.L.
Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)
Teléfono: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82
www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

HELITRÍN CIPER EC GREEN

PELIGRO



LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN CASO DE EXPOSICIÓN Y/O CONTACTO SON:

- El producto contiene cipermetrina. Puede producir parestesia.

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN

- Retirar a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de

INDICACIONES DE PELIGRO

- H373 Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P260 No respirar el aerosol.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391 Recoger el vertido.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligrosos a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

- Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
- **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

CONSEJOS TERAPEUTICOS

- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono: 91-562-04-20

Nº Registro D.G.S.P.: 20-30-10416-HA
NºUFI: 1S30-50P5-M00E-XN8C