

PROTEO Flow

Deltametrina 2,394%
Disolvente y excipientes c.s.p.100%

Insecticida concentrado en suspensión para su uso contra insectos rastreros, incluyendo cucarachas y hormigas, mediante tratamiento de huecos y hendiduras.

e1L

DESCRIPCIÓN DEL USO: Tipo de producto: 18 Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos - **Ámbito de utilización:** Interior - **Categoría de usuario:** Personal Profesional especializado - **Dosis:** 10 ml de producto diluido en 1 L de agua para tratar 20 m² de superficie. El tratamiento se puede repetir tras 2 meses desde la última aplicación - **Organismo diana 1:** Insectos rastreros (cucarachas y hormigas) - **Método de aplicación:** Pulverización. Tratamiento en huecos y hendiduras mediante pulverización de baja presión (manual o de mochila) - **Frecuencia de uso:** Máximo de 6-8 aplicaciones/año - **Organismo diana 2:** Insectos voladores (moscas y avispas) - **Método de aplicación:** Pulverización. Un dispositivo de pulverización especial, por ejemplo, una lanza rociadora, se debe conectar al rociador para apuntar al área de aplicación del producto. Identifique dónde suelen asentarse los insectos y rocíe el

producto sólo como tratamiento localizado en lugares que no se limpian regularmente en húmedo (por ejemplo, en marcos de ventanas, alrededor de ventanas y bordes, en paredes o techos) - **Frecuencia de uso:** Máximo de 6 aplicaciones/año - **INSTRUCCIONES DE USO:** El producto deberá ser diluido en agua en un porcentaje de 1:100. La dilución obtenida será pulverizada en una dosis de 1 litro de dilución por cada 20 m². La dilución lista para usar se aplicará a través de un pulverizador de baja presión (de mano o de mochila). Para la limpieza, ENJUAGUE A FONDO EL RECIPIENTE VACÍO mediante un sistema de lavado a presión, o manualmente enjuagando tres veces. Lavar también el pulverizador. No reutilizar los envases. El producto no está concebido para ser utilizado en explotaciones ganaderas, por lo que no se espera contaminación de animales domésticos o ganaderos. No mezclar con otros productos

químicos u otros productos biocidas. Evite el contacto con las superficies tratadas. No aplicar el producto en presencia de personas (especialmente niños), mascotas o animales. Retirar cualquier comida o productos alimenticios de la zona a tratar - **Para insectos voladores:** Se espera un efecto de derribo contra las moscas 8 horas después de la exposición de los insectos a las superficies tratadas. Las personas responsables de la limpieza de las áreas tratadas deben ser informadas por el usuario profesional sobre las medidas de mitigación del riesgo para garantizar que el producto no ingrese al sistema de alcantarillado - **Para insectos arrastrantes:** Se recomienda utilizar PROTEO FLOW a través de dispositivos de bombeo o pulverizadores, tomando la precaución de aplicar la solución únicamente en grietas y rendijas. La aplicación se realizará en una banda de 0,1 m de ancho en las superficies tratadas - **MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL**

RIESGO: PARA USO ÚNICAMENTE COMO INSECTICIDA. SOLO PARA USO EN INTERIORES. Guarde el producto en su embalaje original fuera del alcance de los niños y mascotas. Lávese las manos después de la manipulación, procesamiento y antes de las comidas. No mezclar con otros químicos y productos. Evite el contacto con superficies tratadas. No aplicar en presencia de personas (especialmente niños) mascotas o animales. Nunca se debe conservar la solución insecticida diluida. Cada vez se debe preparar una nueva solución. No aplicar en presencia de alimentos/piensos. Retire cualquier alimento/pienso del lugar de aplicación. Retire cualquier herramienta que pueda entrar en contacto con los alimentos/piensos durante el tratamiento. Cubra los tanques de agua, comederos y otras superficies o equipos que puedan entrar en contacto con los piensos/alimentos antes del tratamiento para evitar

cualquier contaminación. Las áreas tratadas pueden ser reocupadas por el público en general, las mascotas y otros animales una vez que las superficies rociadas estén secas. Agita bien antes de usar. Contiene deltametrina, puede ser peligroso/tóxico para las mascotas (por ejemplo, gatos, peces y otros organismos acuáticos). Mantenga a los gatos alejados de las superficies tratadas. Debido a su particular sensibilidad a la deltametrina, el producto puede provocar reacciones adversas graves en los gatos - **Manejo de resistencias:** La deltametrina se utiliza en productos biocidas durante un periodo limitado y, por lo tanto, no se espera que contribuya al desarrollo de resistencia en los organismos objetivo. Para evitar el desarrollo de resistencia en los organismos objetivo, se recomienda alternar el uso de productos a base de deltametrina con otros productos insecticidas que no contengan piretroides.

PROTEO FLOW



PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO: H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos - **EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-ona y una mezcla de 3:1 de 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolinona y 2-metil-3(2H)-isotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica - **CONSEJOS DE PREVENCIÓN: P102** Mantener fuera del alcance de los niños - **P103** Leer la etiqueta antes del uso - **P273** Evitar su liberación al medio ambiente - **P391** Recoger el vertido - **P501** **Uso personal especializado:** Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente - **PRIMEROS AUXILIOS:** Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en

caso de exposición y/o contacto son: Irritación transitoria de piel, ojos y membranas mucosas - **Medidas básicas de actuación:** Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada - En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas - En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar - En caso de ingestión, enjuague la boca y NO provoque el vómito, a menos que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud - Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas - Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase - NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN

CASO - Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte - **INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE:** La dilución insecticida obtenida nunca será almacenada. Prepare una nueva dilución cada vez - No contaminar charcas o lagos, ni tuberías de agua o acequias con el producto diluido o con el envase vacío - No vaciar en desagües - Cuando vacíe el envase, ENJUAGUE A FONDO EL RECIPIENTE VACÍO usando un dispositivo de lavado a presión o manualmente enjuagando tres veces. Lavar también el pulverizador. No reusar los envases - Eliminar el contenido y el envase de acuerdo con la regulación local sobre gestión de residuos - **MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** Evitar su liberación al medio ambiente (aguas superficiales o subterráneas), aguas residuales, drenajes, etc... con la construcción de barreras protectoras o sistemas de drenaje cerrado - Comunicar

a las autoridades competentes las fugas o vertidos en cursos de agua, desagües, alcantarillado... - Método y materiales para la contención y limpieza del producto: Absorber el vertido con material inerte (arena, caolín...), recoger y después colocar en contenedores debidamente identificados para su tratamiento como residuo peligroso - **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** El producto debe ser almacenado en su envase original y debidamente cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado - Evitar las altas temperaturas y la acción directa de la luz del sol - Proteger de la humedad - Los envases se deben de colocar de manera que de tal modo que permitan la libre circulación de aire fresco - No almacenar junto con oxidantes, bases (soluciones causticas) o ácidos - Mantener alejado de alimentos, bebidas o piensos - Revisar regularmente los productos almacenados para detectar posibles daños - Bajo estas condiciones, PROTEO FLOW puede ser almacenado durante 4 años.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.
Teléfono 91 562 04 20.

Título:
SHARDA EUROPE B.V.B.A
Jozef Mertensstraat 142
1702 Dilbeek - Bélgica
+32 02/466 44 44
regn@shardaintl.com

Fabricado y distribuido por:

D+S
oabe

DTS OABE S.L.
Pol. Industrial Zabale, par. 3
48410 Orozko (Vizcaya)
Telf.: 94 633 06 55
Fax: 94 633 95 82
www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

Nº Registro D.G.S.P.: ES/BB(MR)-2017-18-00445
UFI TPXW-G88D-E00S-WVMN