

considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codificación del residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE. 07.04.13. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe • **DATOS SOBRE LOS EFECTOS DIRECTOS O INDIRECTOS PROBABLES, INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE** • Si se necesita consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase • **EN CONTACTO CON LA PIEL:** Qúitese toda la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavar la piel con agua. Si se produce irritación de la piel o erupción cutánea: Consulte a un médico • **CONTACTO CON LOS OJOS:** Si se presentan síntomas enjuague con agua. Qúitese las entes de contacto, si están presentes y es fácil. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico • **EN CASO DE INGESTIÓN:** Si se presentan síntomas, llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico • **EN CASO DE INHALACIÓN:** No aplica • **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO:** No almacenar

cerca de alimentos, bebidas y piensos. Periodo de validez de 24 meses. El producto debe almacenarse protegido de la luz.

PANDORA GEL Cucarachas

Cebo en gel de elevada palatabilidad para el control profesional de cucarachas.

MODO DE ACCIÓN: El ingrediente activo Imidacloprid actúa uniéndose a las neuronas de los insectos. Esta unión provoca una perturbación en la transmisión de los impulsos nerviosos letal para las cucarachas • Las cucarachas, fuertemente atraídas por el gel-cebo, entran en contacto con el producto, lo ingieren y se impregnan con él, trasladándolo al nido, en donde contaminarán el resto de la colonia • En circunstancias normales las gotas de gel permanecen activas al menos durante 2 meses • **USOS AUTORIZADOS: Uso # 1** – Interior contra cucaracha alemana (*Blattella germanica*) ninfas y adultas y cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) ninfas y adultas • Aplicación en grietas y rendijas • **Dosis a baja infestación:** 0,1 g/m². (0,1 g equivale a una gota de 5 mm de diámetro) • **Dosis a alta infestación:** 0,2 g/m² para cucaracha alemana y 0,3 g/m² para cucaracha oriental • **Frecuencia de tratamiento:** máximo 6 aplicaciones por año • **Instrucciones**

específicas de uso: El producto debe aplicarse solo en áreas restringidas a superficies que no se limpian regularmente, por ejemplo, detrás o debajo de la nevera, debajo del fregadero de la cocina, debajo del horno o del calentador de agua, en todas las grietas y hendiduras que pueden ser un refugio para cucarachas. No exponga las gotas de cebo a la luz solar ni a fuentes de calor (es decir, radiadores). No aplicar sobre superficies porosas. En caso de que no sea posible, aplicar el producto sobre una lámina de plástico • Aplicación en trampa en bandeja • **Dosis a baja infestación:** 0,2 g/m² (0,75 g bandeja/4 m²; 1 g bandeja/5 m²; 1,2 g bandeja/6 m²; 1,4 g bandeja/7 m²) • **Dosis a alta infestación:** 0,3 g/m² (0,75 g bandeja/2,5 m²; 1 g bandeja/3 m²; 1,2 g bandeja/4 m²; 1,4 g bandeja/5 m²) • **Frecuencia de tratamiento:** máximo 6 aplicaciones por año • **Instrucciones específicas de uso:** Si se ve o se sospecha una gran cantidad de cucarachas, consulte la tasa de aplicación para "alta infestación". Si solo se han visto unas cuantas cucarachas individuales, consulte la tasa de aplicación para "baja infestación". Las bandejas portacebo deben de ser resistentes a la manipulación. No fuerce la apertura de las bandejas portacebo • **Uso # 2** – Uso en exteriores como barrera alrededor de los

PANDORA Gel Cucarachas

Imidacloprid..... 2,15%
Excipientes csp..... 100%

INDICACIONES DE PELIGRO: H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos; con efectos duraderos • **EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede producir una reacción alérgica • **CONSEJOS DE PRUDENCIA: P273** Evitar su liberación al medio ambiente • **P391** Recoger el vertido • **P501** Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente • **CATEGORÍA DE USUARIO:** Personal profesional especializado.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

ATENCIÓN



Lote:
F. cad.:

N.º RDGSP:
ES/BB(MR)-2024-18-00926
UFI: RS50-TOJ9-NOOT-4GNU

FABRICANTE:

DTS OABE, S.L.
Pol. Industrial Zabale Parc. 3
48410 Orozko (Vizcaya)
T. 94 633 06 55
F. 94 633 95 82
www.dts-oabe.com
dts-oabe@dts-oabe.com

TITULAR:

SHARDA CROPHEM ESPAÑA S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina Nº 3 Planta 12
30006 - Murcia (España)

edificios en posibles puntos de entrada de cucaracha alemana (*Blattella germanica*) ninfas y adultas y cucaracha oriental (*Blatta orientalis*) ninfas y adultas • Aplicación en bandejas portacebos • Aproximadamente 0,3 g/m de perímetro. (0,75 g bandeja/2,5 m; 1 g bandeja/3 m; 1,2 g bandeja/4 m; 1,4 g bandeja/5 m) • **Frecuencia de tratamiento:** máximo 6 aplicaciones por año • **Instrucciones específicas de uso:** Aplicar las bandejas portacebos en superficies duras tales como terrazas o patio. Las bandejas portacebos deben de ser resistentes a la manipulación. No fuerce la apertura de la bandeja portacebos. Aplique solo en áreas que no sean susceptibles de sumergirse o mojarse, es decir, protegidas de la lluvia, las inundaciones y el agua de limpieza. No utilice el producto donde no se pueda evitar la emisión al desagüe (alcantarillado) • **MODO DE EMPLEO. INSTRUCCIONES DE USO:** Cumplir con las instrucciones de uso. Antes del tratamiento, retirar toda fuente natural de alimento para las cucarachas (desechos, restos de comida ...) de la zona infestada para favorecer la ingestión del gel. Durante las inspecciones, verifique el área tratada y, si es necesario, reemplace el gel usado ya que las cucarachas dejan secreciones y heces para atraer a sus congéneres. El

producto se puede utilizar de forma continua durante 3 meses sin reemplazar las bandejas de cebo abiertas o los cebos no consumidos. Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es efectivo. Para proteger a las aves, mascotas y mamíferos, las cucarachas muertas deben retirarse del área tratada diariamente. Revise las bandejas portacebo una vez a la semana. Si la infestación persiste a pesar de seguir las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con un controlador de plagas profesional. Evite el uso continuo del producto. Al final de la campaña de tratamiento, recolecte las bandejas portacebos para su eliminación • **MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Coloque el cebo fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo. Evite su liberación al medio ambiente. No lo use directamente sobre o cerca de alimentos, piensos o bebidas, o sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos, bebidas y animales • **INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE:** Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son