




HELITRIN FOGGING

Generador de humo Insecticida a base de permetrina (fumígeno), para el tratamiento en grandes espacios.

R.D.G.S.P.: ES/MR(NA)-2019-18-00635
Tipo de producto: Fumígeno para insectos voladores y rastrosos.
Usos autorizados: Fumigación en interior por Personal profesional especializado.
Apariencia: Bote metálico con mecha.
Presentación: Bote de 30g. Cajas de 6 unds.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Nombre químico: Permetrina 13,5%
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de m-fenoxibencilo
Número CAS: 52645-53-1 . **Número EC:** 258-067-9



OTRAS SUSTANCIAS DE INTERÉS

Nombre químico: Clorato potásico: 13,5% (p/p)
Número CAS: 3811-04-9 . **Número EC:** 223-289-7

Nombre químico: Talco: 53,0% (p/p)
Número CAS: 14807-96-6 . **Número EC:** 238-877-9

MEDIDAS DE PROTECCIÓN



CLASIFICACIÓN E INDICACIONES DE PELIGRO

Sólidos comburentes. Cat. 3, H272
Toxicidad aguda. Cat 4, H302
Sensibilización cutánea. Cat. 1, H317
Acuático crónico Cat. 1, H410



HELITRIN FOGGING (Bote de 30 g)

Uso autorizado	Condiciones de uso	Organismos diana	Dosis
Personal Profesional Especializado. Interiores. Áreas domesticas (casas privadas), garajes, bodegas, áticos. Almacenes comerciales y en lugares industriales o electrodomeísticos, camiones o trenes que transportan granos que <u>nunca deben someterse a limpieza húmeda.</u>	Colocar el generador de humo sobre una superficie resistente al calor. Retirar la tapa, poner la mecha en posición vertical y encenderla. Frecuencia de aplicación: Una aplicación por cada infestación. No se ha demostrado eficacia residual.	Insectos voladores: - Mosca común (Musca domestica) - Mosca de la carne (Calliphora vomitoria) - Mosquito (Culex pipiens)	Exposición 4h al producto. Dosis: 30g x 950 m³ Exposición 4h al producto. Dosis: 30g x 950 m³ Exposición 24h al producto Dosis: 30g x 950 m³
		Insectos rastrosos: - Cucaracha alemana (Blattella germanica) - Cucaracha americana (Periplaneta americana) - Cucaracha oriental (Blatta orientalis)	Exposición 4h al producto. Dosis: 30g x 60 m³ La reducción máxima de población se alcanza a las 48 horas
		Plagas de productos almacenados: - Polilla de la harina (Ephesia kuehniella) - Palomilla bandeada (Plodia interpunctella) - Escarabajo del tabaco (Lasioderma serricorne)	Exposición 24h al producto. Dosis: 30g x 240 m³

INSTRUCCIONES DE USO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Lávese las manos y la piel expuesta antes y después del uso. No usar cuando haya alimentos o animales productores de alimentos. No reutilizar la ropa contaminada. Mantenga el producto en un lugar con calor. No inhale el vapor. Retire el producto de las superficies donde es más probable el contacto después del periodo de ventilación (limpieza en seco). Solo uso en interiores. Evacuar el ganado antes del tratamiento. Retirar todos los alimentos, bebidas y piensos antes del tratamiento. Retire todos los utensilios de cocina y cubierto, cualquier herramienta que pueda entrar en contacto con alimentos o piensos durante el tratamiento. Después del periodo de ventilación, limpie las superficies tratadas antes de volver a usarlas (limpieza en seco). El producto debe usarse de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta. Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar y siga todas las instrucciones proporcionadas. Mantenga aislada el área a tratar, bloquee las ventanas y las puertas durante un mínimo de 4 horas adecuando el tiempo de exposición para cada organismo diana. Al sellar la habitación, es necesario bloquear (por ejemplo, con cinta adhesiva) los agujeros de las cerraduras, cualquier espacio en la parte inferior, los lados de la puerta hacia el exterior y hacia el interior de la habitación tratada y cualquier grieta en los marcos de las ventanas tanto hacia el exterior como hacia el interior del edificio. Calcule el número adecuado de generadores de humo para la estancia a tratar. Colóquelos en una superficie a prueba de incendios, pero nunca en un espacio cerrado como un cubo. Los generadores de humo deben colocarse en el medio del piso del área tratada. Deje que el producto esté activo no menos de 4 horas o 24 horas, dependiendo de la especie objetivo. Después ventile completamente la estancia abriendo ventanas y puertas. El producto es solo para interiores y debe aplicarse estrictamente en áreas que no se limpian en húmedo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco, bien ventilado, alejado de los niños, personas no autorizadas, alimentos o piensos. Proteger de los rayos solares directos. Mantener alejado de fuentes de combustión y cerca de medios de extinción. El producto es estable durante 24 meses en el envase original. Evitar la temperatura de almacenamiento por encima de 40°C.